

Anexo 2

Desenlaces a evaluar en prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica (EDA) en niños menores de cinco años

1. Prevención de la EDA

Desenlaces: Prevención primaria

Críticos

- Incidencia de diarrea (número de episodios año)
- Incidencia de infección por rotavirus*
- Prevalencia de diarrea (número de días de diarrea al año)
- Número de hospitalizaciones

Importantes no críticos

- Prevalencia de infección por rotavirus (días de diarrea por rotavirus)*
- Atenciones ambulatorias al año por diarrea
- Mortalidad

2. Diagnóstico y evaluación del niño con EDA

Desenlaces: Pruebas diagnósticas

Críticos

- Sensibilidad
- Especificidad
- Cociente de probabilidad + (LR+)
- Cociente de probabilidad - (LR-)

Importantes no críticos

- Área bajo la curva ROC
- Ganancia de peso durante la hidratación*

3. Hidratación: prevención y tratamiento

Desenlaces: Prevención de deshidratación

Críticos

- Frecuencia de deshidratación
- Frecuencia de ingreso hospitalario
- Mortalidad

Desenlaces: Hidratación

Críticos

- Necesidad de líquidos venosos
- Frecuencia de fracaso en la TRO
- Mortalidad
- Recurrencia de DHT *
- Frecuencia de hospitalización
- Íleo
- Hiponatremia
- Número de vómitos
- Duración de la diarrea
- Aumento de peso

Importantes no críticos

- Ingesta total de líquido (volumen)
- Alta < 8 horas
- Alta < 48 horas
- estancia hospitalaria (duración)
- Hipernatremia
- Número de deposiciones
- Gasto fecal
- Diarrea al día 7
- Tpo. Primera deposición formada
- Balance de sodio y/o potasio
- Hiponatremia asintomática
- Flebitis

4. Alimentación

Desenlaces: alimentación

Críticos

- Duración de la diarrea
- Gasto fecal
- Aumento de peso
- Proporción de fracaso en el tratamiento (DHT)
- Número de deposiciones día
- Proporción de niños que recaen en la deshidratación*
- Fracaso en al hidratación*
- Tiempo para hidratarse+

Importante no críticos

- Proporción de niños con vómitos
- Cantidad de vómito
- Número de vómitos
- Consumo total de suero oral
- Consumo total de fórmula láctea

5. Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos

Desenlaces: tratamiento farmacológico

Críticos

- Días con diarrea
- Proporción de niños con DP
- Proporción de niños con diarrea al día 5
- Proporción de diarrea al día 3,4,5,6 7,8,10*
- Gasto fecal**
- Número de deposiciones por día
- Número de hospitalizaciones
- Eventos adversos*

Importantes no críticos

- Efectos adversos*
- Muerte
- Necesidad de Líquidos venosos
- Volumen de SRO ingerido
- Cantidad de vómito
- Gasto urinario
- Tiempo hasta primera deposición formada

Desenlaces: tratamiento antiemético

Críticos

- Número de hospitalizaciones
- Eventos adversos
- Cantidad de vómito
- Número de vómitos
- Tiempo de cese del vómito
- Días con vómitos
- Vómito durante la TRO

Importantes no críticos

- Gasto fecal
- Días de duración de la diarrea deposición formada