

Anexo 6

Preguntas GAI de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica (EDA) en niños menores de cinco años

| PREVENCIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Recomendación de NOVO Posiblemente Adaptable | | Guía 01 | | Guía 02 | | Guía 08 | | Guía 10 | | Guía 11 | | Guía 48 | |
| | | Cincinnati | | Reino Unido | | NICE | | Colombia - Lozano | | Australia - Victorian Department of Human Services | | Guía Ibero-latinoamericana EDA | |
| PREGUNTAS ESPECIFICAS | | Acute Gastroenteritis in children aged 2 months through 5 years | | An evidence and consensus based guideline for acute diarrhoea management | | Diarrhoea and vomiting caused by gastroenteritis diagnosis, assessment and anagement in children younger than 5 years | | Enfermedad diarreica aguda | | Evidence based practice guideline for the management of diarrhoea with or without vomiting in children | | Guía Ibero-latinoamericana EDA | |
| Prevención de la EDA | | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones |
| 1 | ¿Como se define enfermedad diarreica aguda? ¿Como se define gastroenteritis? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 2 | ¿Cuáles son los principales factores de riesgo en nuestro medio para desarrollar enfermedad diarreica aguda? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 3 | ¿La lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida previene la aparición de EDA? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 3.1 | ¿Los niños menores de 5 años que recibieron <u>leche materna exclusiva hasta los seis meses, hasta el año o hasta los dos años</u> , comparados con los que no la recibieron hasta cada edad, tienen menos incidencia y/o prevalencia de EDA? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |

| | | | | | | | | |
|-------|--|------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | ¿La suplementación diaria con micronutrientes previene la aparición de EDA? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 4.1 | ¿Los niños menores de 5 años que reciben vitamina A en comparación con los no que la reciben, tienen menor incidencia de EDA? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta |
| 4.2 | ¿Los niños menores de 5 años que reciben suplemento de cinc en comparación con los no que lo reciben, tienen menor incidencia de EDA? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 5.5.1 | ¿Los niños menores de 5 años que reciben <u>probióticos, prebióticos, mezclas de ambos (simbióticos) o leches fermentadas (yogur, kumis u otras similares)</u> en comparación con los que no la reciben, tienen menor incidencia y/o prevalencia de EDA? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 6 | ¿Los niños menores de 5 años que reciben vacuna contra rotavirus (mono o polivalente) comparados con los que no reciben vacuna, tienen menor incidencia y/o prevalencia de EDA? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 7 | ¿Los niños menores de 5 años cuyos cuidadores practican medidas de higiene de manos rutinariamente y/o lavan las manos de los niños en comparación con la ausencia de esta práctica, tienen menos prevalencia y/o incidencia de EDA? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|--|--|--|--|--|--|
| 8 | ¿Cuál es la mejor intervención educativa o la mejor forma de promover prácticas educativas (videos, folletos, esquemas, dibujos, charlas comunitarias, etc.) dirigidas a los padres, a la familia y a la comunidad, para prevenir la diarrea o para disminuir la incidencia/prevalencia de EDA y las complicaciones de la enfermedad? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 9 | ¿Cuáles son los factores de riesgo para complicaciones (deshidratación, hospitalización, diarrea persistente, desnutrición, muerte, entre otros) que existen en los niños menores de 5 años con EDA? | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |

| DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN CLÍNICA | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Recomendación de NOVO Posiblemente Adaptable | | Guía 01 | | Guía 02 | | Guía 08 | | Guía 10 | | Guía 11 | | Guía 48 | |
| | | Cincinnati | | Reino Unido | | NICE | | Colombia - Lozano | | Australia - Victorian Department of Human Services | | Guía Ibero-latinoamericana EDA | |
| PREGUNTAS ESPECÍFICAS | | Acute Gastroenteritis in children aged 2 months through 5 years | | An evidence and consensus based guideline for acute diarrhoea management | | Diarrhoea and vomiting caused by gastroenteritis diagnosis, assessment and anagement in children younger than 5 years | | Enfermedad diarreica aguda | | Evidence based practice guideline for the management of diarrhoea with or without vomiting in children | | Guía Ibero-latinoamericana EDA | |
| Diagnóstico y evaluación | | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones |
| 10 | ¿En los niños menores de 5 años con EDA cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes en el mundo y en el país? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 11 | 11.1 ¿En los niños menores de 5 años con EDA, cuál es la precisión diagnóstica de la <u>sangre visible en heces</u> , <u>lactoferrina</u> , <u>el conteo de leucocitos en materia fecal</u> , <u>azúcares reductores</u> , <u>sangre oculta</u> o <u>el pH</u> , en comparación con el <u>cultivo de materia fecal</u> para detectar infección bacteriana invasora? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 11.2 | 11. 2. ¿Cuáles son las indicaciones para solicitar un estudio de materia fecal (coprológico, coprograma, coproscópico, directo de materia fecal) en los niños menores de cinco años con EDA? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | Puede responder algo de la pregunta | Puede responder algo de la pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |

| | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------|--|--|--|---|---|--|
| 12 | ¿En los niños menores de 5 años de edad con EDA, cuáles es la precisión diagnóstica de los signos y síntomas que permiten evaluar la presencia y la gravedad de la deshidratación? | Probable Adaptable | Puede responder algo de la pregunta | Puede responder algo de la pregunta | Puede responder algo de la pregunta | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 13 | ¿Cuál es el ámbito en el que se debe realizar el manejo y la vigilancia del niño menor de cinco años con EDA? | Novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 13.1 | ¿Cuáles son los criterios para realizar tratamiento intrahospitalario? | | | Puede responder algo de la pregunta | Puede responder algo de la pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| | | | | | Puede responder algo de la pregunta | | | |
| 13.2 | ¿Cuáles son los criterios para trasladar a los niños con EDA a un mayor nivel de complejidad/atención en salud? | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 13.3 | ¿Cuáles son los criterios para dar alta a un niño con EDA que estuvo en urgencias u hospitalizado? | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |

| TRATAMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|---------------|---|---------------|--|--|--|--|--------------------------------|---|
| Recomendación de NOVO Posiblemente Adaptable | | Guía 01 | | Guía 02 | | Guía 08 | | Guía 10 | | Guía 11 | | Guía 48 | |
| | | Cincinnati | | Reino Unido | | NICE | | Colombia - Lozano | | Australia - Victorian Department of Human Services | | Guía Ibero-latinoamericana EDA | |
| PREGUNTAS ESPECIFICAS | | Acute Gastroenteritis in children aged 2 months through 5 years | | An evidence and consensus based guideline for acute diarrhoea management | | Diarrhoea and vomiting caused by gastroenteritis diagnosis, assessment and anagement in children younger than 5 years | | Enfermedad diarreica aguda | | Evidence based practice guideline for the management of diarrhoea with or without vomiting in children | | Guía Ibero-latinoamericana EDA | |
| Prevención y tratamiento de la deshidratación: | | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones | Recomendación | Observaciones |
| 14 | ¿En los niños menores de 5 años de edad con EDA sin deshidratación, ofrecer <u>sales de rehidratación oral (SRO) comparado con líquidos con base en frutas o cereales, bebidas carbonatadas, sueros hiposmola-res, solución de sal y azúcar u otros líquidos con sodio y glucosa</u> , disminuye el riesgo de deshidratación y/o evita complicaciones como hiponatremia e hipokalemia? | no | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente |
| 15 | ¿En los niños menores de 5 años con EDA, que necesitaron rehidratación con líquidos parenterales, <u>continuar líquidos parenterales en comparación con SRO</u> , aumenta el riesgo de recaída en deshidratación? | no | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |

| | | | | | | | | |
|----|---|------|--|--|---|---|---|---|
| 16 | ¿En los niños menores de 5 años con diarrea aguda y deshidratación leve y moderada, realizar la rehidratación por <u>vía oral</u> , comparado con la rehidratación por <u>sonda gástrica</u> y con la <u>rehidratación por vía parenteral</u> , es diferente, para corregir la deshidratación y/o evitar complicaciones como hiponatremia e hipokalemia? | 17 | Puede responder algo de la pregunta | Puede responder algo de la pregunta | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente |
| 17 | ¿En los niños menores de 5 años con EDA y deshidratación leve y moderada en los cuales se decide hidratación con líquidos parenterales, es diferente administrar <u>solución salina</u> , <u>lactato de Ringer</u> , o <u>solución polielectrolítica</u> , para corregir la deshidratación leve y moderada y/o evitar complicaciones como hiponatremia e hipokalemia? | novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 18 | ¿En los niños menores de 5 años con EDA y deshidratación grave, es diferente administrar <u>solución salina</u> , <u>lactato de Ringer</u> , o <u>solución polielectrolítica</u> , para corregir la <u>deshidratación</u> y/o evitar complicaciones como hiponatremia e hipokalemia? | novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |

| ALIMENTACIÓN | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------|---|-------------|---|-------------|--|-------------|---|-------------|
| Recomendación de NOVO Posiblemente Adaptable | | Guía 01 | | Guía 02 | | Guía 08 | | Guía 10 | | Guía 11 | | Guía 48 | |
| | | Cincinnati | | Reino Unido | | NICE | | Colombia - Lozano | | Australia - Victorian Department of Human Services | | Guía Ibero-latinoamericana EDA | |
| PREGUNTAS ESPECIFICAS | | Acute Gastroenteritis in children aged 2 months through 5 years | | An evidence and consensus based guideline for acute diarrhoea management | | Diarrhoea and vomiting caused by gastroenteritis diagnosis, assessment and anagement in children younger than 5 years | | Enfermedad diarreica aguda | | Evidence based practice guideline for the management of diarrhoea with or without vomiting in children | | Guía Ibero-latinoamericana EDA | |
| Alimentación: | | Recomendación | Observación | Recomendación | Observación | Recomendación | Observación | Recomendación | Observación | Recomendación | Observación | Recomendación | Observación |
| 19 | ¿En los niños menores de cinco años con EDA, continuar o no la alimentación (recomendación del ayuno), modifica la evolución de la enfermedad? | Possible Adaptable | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | Recomendación está relacionada | | Recomendación está relacionada | | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | |
| 20 | ¿En los niños menores de dos años con EDA, la lactancia materna, la formula infantil o la formulas especiales (fórmula sin lactosa, fórmula de soya, fórmulas hidrolizadas u otras) modifican en el lactante la evolución de la EDA? | Possible Adaptable | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | |
| 21 | ¿En los niños entre seis meses y cinco años de edad, administrar una dieta especial durante el episodio de EDA comparado con no hacerlo, modifica la evolución de la enfermedad? | Possible Adaptable | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | |

Anexo 6. Preguntas GAI de prevención, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad diarreica (EDA) en niños menores de cinco años

| | | | | | | | | |
|----|---|--|---|--|---|--|--|--|
| 22 | ¿En los niños menores de cinco años con EDA cuáles son las recomendaciones de la dieta durante y después de la rehidratación? | Po- sible Adap- table | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | No hay recomenda- ción relacionada con esta pregunta | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | No hay recomenda- ción relacionada con esta pregunta | No hay recomenda- ción relacionada con esta pregunta | No hay recomenda- ción relacionada con esta pregunta |
|----|---|--|---|--|---|--|--|--|

| FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|--|-------------|
| Recomendación de NOVO Posiblemente Adaptable | | Guía 01 | | Guía 02 | | Guía 08 | | Guía 10 | | Guía 11 | | Guía 48 | |
| | | Cincinnati | | Reino Unido | | NICE | | Colombia - Lozano | | Australia - Victorian Department of Human Services | | Guía Ibero-latinoamericana EDA | |
| PREGUNTAS ESPECIFICAS | | Acute Gastroenteritis in children aged 2 months through 5 years | | An evidence and consensus based guideline for acute diarrhoea management | | Diarrhoea and vomiting caused by gastroenteritis diagnosis, assessment and anagement in children younger than 5 years | | Enfermedad diarreica aguda | | Evidence based practice guideline for the management of diarrhoea with or without vomiting in children | | Guía Ibero-latinoamericana EDA | |
| Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos: | | Recomendación | Observación | Recomendación | Observación | Recomendación | Observación | Recomendación | Observación | Recomendación | Observación | Recomendación | Observación |
| 23 | ¿En niños menores de 5 años con EDA cuándo se recomienda el uso de antimicrobianos (ciprofloxacina, trimetoprim/sulfametoxazol, ácido nalidíxico, furazolidona, metronidazol u otros)? | Posiblemente Adaptable | Recomendación está relacionada Recomendación desactualizada Evidencia escasa: El apéndice de la referencia es un reporte de sensibilidad / resistencia del hospital de Cincinnati. Referencian un reporte de la APP | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | | Recomendación está relacionada Evidencia escasa: Solo hay una evidencia ligada: un comité de expertos OMS, 2005 | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | |
| 24 | ¿Cuál es la eficacia de administrar micronutrientes (vitamina A, zinc y otros) en un niño con EDA | novo | No tienen recomendación | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | Hacen una pregunta genérica sobre efectividad y eficacia de las siguientes intervenciones terapéuticas antiméticos, micronutrientes (caen zinc y vitaminaA) antidiarreicos (kaolin, racecadotril, esmectita, bismuto, carbón activado, probióticos, loperamida), no especifican desenlaces | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------------------|---|--|--|---|--|--|
| 24.1 | ¿En los niños menores de 5 años con EDA, ofrecer suplemento de vitamina A comparado con no hacerlo o dar placebo, disminuye la gravedad del episodio (según gasto fecal, duración de la diarrea, o riesgo de hospitalización)? | novo | No tienen recomendación | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | Recomendación está relacionada Evidencia escasa: | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada (1998-2008) Evidencia suficiente |
| 24.2 | ¿En los niños menores de 5 años con EDA, ofrecer suplemento de zinc comparado con no darlo o dar placebo, disminuye la gravedad del episodio (según gasto fecal, duración de la diarrea, o riesgo de hospitalización)? | Posiblemente Adaptable | No tienen recomendación | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada (1998-2008) Evidencia suficiente |
| 25 | ¿En los niños menores de 5 años con EDA, ofrecer prebióticos, probióticos, mezcla de ellos o leches fermentadas (kumis, yogures y otras) comparado con no suministrarlos, disminuye la gravedad del episodio (según gasto fecal, duración de la diarrea, o riesgo de hospitalización)? | Posiblemente Adaptable | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente x Recomendación está relacionada Recomendación actualizada (1996-2007) Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada (2002-2007) Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Recomendación desactualizada (1999-2002) Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada (1998-2008) Evidencia suficiente |
| 26 | ¿Cuál es la eficacia y seguridad de administrar medicamentos antidiarreicos (adsorbentes, antisecretorios o antimotilicos) en un niño con EDA? | | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | tienen recomendación hecha para antimotilicos, antisecretorios, adsorbentes | Anti-diarrhoeal medication should not be used in children with acute gastroenteritis | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente x Recomendación está relacionada Recomendación actualizada (1996-2007) Evidencia suficiente |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------------------|---|--|---|--|---|--|
| 26.1 | ¿En los niños menores de 5 años con EDA, administrar esmética, racecadotril, loperamida, caolín-pectina, el subsalicilato de bismuto en comparación con no suministrarlos o dar placebo, son seguros y disminuyen la gravedad del episodio (según gasto fecal, duración de la diarrea, o riesgo de hospitalización)? | Posiblemente Adaptable | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente x Recomendación está relacionada Recomendación actualizada Evidencia suficiente |
| 27 | ¿Cuál es la eficacia y la seguridad de la administración de los antieméticos en un niño con EDA? | novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Puede responder algo de la pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 27.1 | ¿Cuáles son las indicaciones de la utilización de antieméticos en niños menores de cinco años con EDA y vómito? | novo | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |
| 27.2 | ¿En los niños menores de 5 años con EDA, administrar metoclopramida comparada con ondansetrón, con el placebo y con no suministrarla, disminuye la gravedad (según gasto fecal, duración de la diarrea, o riesgo de hospitalización), de forma segura? | Posiblemente Adaptable | Recomendación está relacionada Recomendación desactualizada Evidencia escasa: Refieren 2 ensayos clínicos con resultado favorable para ondansetrón / ambos 2002 / Desactualizada | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada (1996-2007) Evidencia suficiente | Recomendación está relacionada Evidencia escasa: Solo hay una evidencia ligada: metanálisis Cochrane, 2008 | Recomendación está relacionada Recomendación desactualizada (1999-2002) | Recomendación está relacionada Recomendación actualizada (1961-2008) Evidencia suficiente |
| 28 | ¿En los niños menores de 5 años con EDA, algún tratamiento médico alternativo u homeopático comparado con el tratamiento habitual, disminuye la gravedad (hospitalización / complicaciones como sepsis) de forma segura? | novo | No tienen recomendación | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta | No hay recomendación relacionada con esta pregunta |